

COVID-19: Connectivites* et vaccins

1

Je suis atteint d'une connectivite : dois-je me faire vacciner?

1. **Oui**, les vaccins anti-COVID-19, et en particulier les vaccins à ARNm, sont recommandés à toutes les personnes souffrant de connectivites. Les risques associés au COVID-19 sont bien supérieurs aux risques potentiels associés aux vaccins : les milliards de doses administrées et les études en cours montrent que **les vaccins sont sûrs et efficaces**.

2

Dois-je arrêter mon traitement immunosuppresseur pour me faire vacciner?

2. **Pas nécessairement**. Cependant, certains médicaments pourraient réduire l'efficacité du vaccin: **seul votre spécialiste peut évaluer** (en cas de maladie stable et bien contrôlée et sur la base des risques et bénéfices potentiels) **une éventuelle suspension temporaire de votre traitement immunosuppresseur** dans les semaines suivant la vaccination.

3

Dois-je arrêter de prendre des corticoïdes pour me faire vacciner?

3. Des doses quotidiennes de corticoïdes supérieures à 8-10 mg peuvent réduire l'efficacité de la vaccination. C'est pourquoi, pour assurer une réponse vaccinale adéquate, conformément aux recommandations des sociétés scientifiques européennes, **la dose quotidienne de corticoïdes** prise par le patient **doit être réduite** à la dose minimale efficace, **tant que la maladie est stable et bien contrôlée**. Toute modification de votre traitement doit être discutée avec votre spécialiste.

4. **Oui**, le ministère de la Santé et les agences du médicament en Europe estiment qu'un rappel est approprié pour tous les patients souffrant de connectivites, afin d'assurer une meilleure couverture vaccinale. **Le rappel peut être administré 4 mois après la dernière dose**.

4

Dois-je recevoir la troisième dose du vaccin ? Si oui, combien de temps après la deuxième dose?

5

Qui doit recevoir une quatrième dose?

5. En général, **les patients sous traitement immunosuppresseur sont éligibles et fortement encouragés à recevoir une quatrième dose**. Les intervalles dépendent du type de vaccin reçu précédemment. Comme il peut y avoir des exceptions, veuillez consulter votre spécialiste pour obtenir des recommandations spécifiques.

6

Dois-je faire des analyses de sang pour mesurer les anticorps anti-COVID avant de me faire vacciner ou de prendre la 3ème dose?



European
Reference
Network

for rare or low prevalence
complex diseases

Network
Connective Tissue
and Musculoskeletal
Diseases (ERN ReCONNET)

Protégez-vous: portez un masque FFP2 à l'intérieur, aérez fréquemment les espaces fermés, respectez les distances recommandées avec les autres personnes, etc.

6. **Ce n'est pas nécessaire**: le taux d'anticorps développés contre le COVID-19 ne permet pas de savoir si et dans quelle mesure vous êtes protégé contre l'infection. **La troisième dose** de vaccin pour les patients souffrant de connectivite **est recommandée quel que soit le taux d'anticorps**.

*Syndrome des anticorps antiphospholipides, Syndrome d'Ehlers-Danlos, Myopathie inflammatoire idiopathique, maladie associée aux IgG4, Connectivite mixte, Polychondrite atrophante, Syndrome de Sjögren, Lupus systémique érythémateux, Sclérose systémique, Connectivites indifférenciées